

**Stickers des mises à jour du Guide des Examens de Biologie Médicale**

Liste des mises à jour de Mai 2011

**Acide lactique - plasma**

LACT

1 mL Plasma Fluoré • CONGELE &lt; 1H. Domicile déconseillé.

**PRELEVEMENT PARTICULIER OU DELICAT** : les échantillons veineux doivent être prélevés à jeun sans utiliser de garrot. Le sang prélevé sur fluorure doit être immédiatement refroidi sur de la glace, centrifugé à +4°C dans les 15 min, décanté et le plasma congelé dans les 15 minutes suivant le prélèvement. Les prélèvements ictériques et/ou hémolysés doivent être écartés

🕒 1 jour • Chimie - Spectrophotométrie

📄 B 15 - réf 0530

P 36

**Alpha-1 Antitrypsine - phénotype - sérum**

PIH

2 mL Sérum

🕒 4 semaines • Isofocalisation

📄 55.00 EUR non remboursable

P 54

**Anticorps anti-facteur V**

ANTI5

2 mL Plasma Citraté • CONGELE &lt; 1H. Domicile déconseillé.

1 aliquote spécifique pour cette analyse. Indiquer **IMPERATIVEMENT** le taux de Facteur V. Cette analyse ne peut être réalisée que si le taux de facteur V est abaissé

Le titrage est réalisé pour toute recherche positive

Si possible joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse ...) et les circonstances (saignement, thrombose, bilan pré-opératoire ...)

🕒 2 jours • Technique chronométrique

📄 29.00 EUR non remboursable

P 66

**Anticorps anti-facteur XI**

ANT11

2 mL Plasma Citraté • CONGELE &lt; 1H. Domicile déconseillé.

1 aliquote spécifique pour cette analyse. Indiquer **IMPERATIVEMENT** le taux de Facteur XI. Cette analyse ne peut être réalisée que si le taux de facteur XI est abaissé

Le titrage est réalisé pour toute recherche positive

Si possible joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse ...) et les circonstances (saignement, thrombose, bilan pré-opératoire ...)

🕒 2 jours • Technique chronométrique

📄 29.00 EUR non remboursable

P 67

**BNP - Brain Natriuretic Peptide**

BNP

1 mL Plasma EDTA non hémolysé • CONGELE &lt; 4H

**La fiabilité du résultat nécessite impérativement le recueil du prélèvement (plasma EDTA) sur tube plastique**

🕒 1 jour • Chimiluminescence

📄 B 85 - réf 1821

P 89

**D-Dimères**

DDIM

1 mL Plasma Citraté • CONGELE &lt; 4H

1 aliquote spécifique pour cette analyse

🕒 1 jour • Enzymoimmunologie ou Immunoturbidimétrie

📄 B 30 - réf 0176 (recherche) / B 30 - réf 0177 (dosage)

P 117

**Facteur Willebrand antigène + activité coagulante facteur VIII et cofacteur Ristocétine - plasma**

WIL8R

2 mL Plasma Citraté • CONGELE &lt; 1H. Domicile déconseillé.

Si possible joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale,...) et les circonstances (hémorragie, thrombose, bilan pré-opératoire, traitement substitutif ...)

Nous transmettre si possible le groupe sanguin ABO.

En cas de test à la desmopressine (Octim®, Minirin®), bien indiquer le délai pour chaque tube (T0, T+1H)

Plasma déplaqueté par double centrifugation : 2000 g 15 mn

Le dosage du facteur de Willebrand complet (facteur Willebrand activité, antigène et facteur VIII activité) nécessite un minimum de 2 tubes de 1 mL de plasma citraté congelé à -20 °C

Nous transmettre le résultat du temps de saignement et/ou PFA-100 si disponible

🕒 1 jour • Immunoturbidimétrie

📄 B 40 - réf 0178 + B 40 - réf 0187 + B 40 - réf 0192

P 130

**Hépatite C - sérotypage - sérum****ANALYSE Hors-Service**

SERC

P 148

**Lymphocytes CD4 helper inducer ou 4B4 - sang total**

T4HEL

3 mL Sang total EDTA • T° ambiante

Joindre **IMPERATIVEMENT** les résultats de la NFSL'échantillon doit nous parvenir **IMPERATIVEMENT** dans les 24H suivant le prélèvement

🕒 1 jour • Cytométrie en flux

📄 24.00 EUR non remboursable

P 173

**Lymphocytes CD8+ CD57+ - cytotoxiques supresseurs - sang total****CD48C**

3 mL Sang total EDTA • T° ambiante

*Joindre IMPERATIVEMENT les résultats de la NFS**L'échantillon doit nous parvenir IMPERATIVEMENT dans les 24H suivant le prélèvement*

🕒 2 jours • Cytofluorimétrie

💰 24.00 EUR non remboursable

P 173

**Rhinovirus - diagnostic direct - PCR****RHIBM**

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA

*Existe aussi en PCR multiplex (VIRBM) comprenant les détections des virus VRS, HMPV et Rhinovirus**Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport pour virus fourni sur demande*

🕒 3 jours • PCR en temps réel

💰 115.00 EUR non remboursable

P 210

**Syphilis - sérologie confirmation IgM****FTABM**

1 mL Sérum

0.5 mL (minimum) LCR

🕒 1 semaine • Western-Blot

💰 B 180 - réf 1251

P 220

**VIH1 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - plasma****HIVQ**

4 mL Plasma EDTA • CONGELE &lt; 4H

*Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase**1 aliquote spécifique pour cette analyse*

🕒 3 jours • PCR en temps réel

💰 B 220 - réf 4122

P 236